

Чего не стоит делать

Не используйте болевые приемы

Почему нельзя использовать болевые приемы. Не нужно бить по щекам, давить на болевые точки и растирать пострадавшему уши. Оказывающий помощь рискует не рассчитать силы и нанести пострадавшему травмы.

Чем заменить. Вместо того, чтобы лупить человека без сознания, проверьте пульс на сонной артерии. Это уже неприятное для пострадавшего действие. Если он не пришел в сознание при проверке пульса, потерпите. Пострадавший придет в сознание сам. Длительность обморока – до четырех минут. О том, что делать, если пострадавший находится без сознания более четырех минут, узнаете в уроке «Кома».

Не поливайте
лицо
пострадавшего
водой

Почему нельзя лить на лицо пострадавшего воду.

Человек без сознания может захлебнуться от потока.

Чем заменить. Смочите тряпку или салфетку водой и протрите лицо, шею, мочки ушей пострадавшего. Ему будет легче прийти в себя. Этот способ поможет и в предобморочном состоянии. Если вовремя его использовать – человек не упадет в обморок.

Не используйте нашатырный спирт

Использовать нашатырный спирт запрещено. Во-первых, вы не найдете нашатырь в составе аптечек первой помощи, т.к. только медики могут использовать лекарственные средства. А во-вторых, вы рискуете ухудшить состояние пострадавшего, даже если умеете пользоваться нашатырем по старым правилам. Дело в том, что пары аммиака в высокой концентрации могут вызвать рефлекторную остановку дыхания. Кроме того, нашатырь при наружном применении вызывает ожоги кожного покрова. Не натирайте нос и виски пострадавшего.

Чем заменить. Освободите шею пострадавшего от шарфов, расстегните куртку, чтобы пострадавшему было легче дышать. Если вы находитесь в помещении – откройте окна.